



SERVICE DE DERMATOLOGIE

HÔPITAL TROUSSEAU - Avenue de la République à Chambray-lès-Tours

Hospitalisation Section A : ☎ 02.47.47.46.19 - Section C : ☎ 02.47.47.81.29
Consultations Adultes et Lymphologie: ☎ 02.47.47.46.07 - Pédiatrie et laser colorant : ☎ 02.47.47.47.65
Fax : 02.47.27.71.98 - Secrétariat Pr LORETTE et Pr VAILLANT : ☎ 02.47.47.46.25
Consultations de Dermatologie buccale : ☎ 02.47.47.46.35

FICHE D'INFORMATION PATIENT : Traitement par CAELYX

Vous avez une chimiothérapie par Caelyx® pour un sarcome. Le Caelyx® vous sera administré par **voie intraveineuse** en hospitalisation dans le service de Dermatologie.

Lors de chaque « cure » de Caelyx®, vous aurez **une perfusion sur une hospitalisation d'une journée. La perfusion dure environ 30 minutes.**

La chimiothérapie est administrée **toutes les 3 semaines** en hospitalisation d'une journée.

Cette chimiothérapie peut comporter des effets secondaires :

- effets sur la peau (rougeur et brûlures notamment des paumes et des plantes)
- perte de cheveux
- aphtes et douleurs de la bouche
- douleurs abdominales, diarrhée
- une diminution des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes
- une sensibilité aux infections
- une fatigue
- des réactions allergiques au moment de la perfusion (asthme, bouffées de chaleur, fièvre...)

Selon votre tolérance, vous pourrez continuer de travailler entre les cures de chimiothérapie. Si vous êtes trop fatigué, le médecin vous prescrira un arrêt de travail.

Vous devrez faire **une prise de sang dans un laboratoire d'analyses, 3 jours avant la cure suivante**, afin de surveiller les globules rouges, globules blancs et les plaquettes et le bilan du foie. Les résultats devront être transmis par le laboratoire d'analyses par **fax** dans le service de Dermatologie. **Emmenez tout de même les résultats de votre prise de sang avec vous, lors la cure de chimiothérapie.** La cure pourra être annulée et décalée en cas de diminution importante des chiffres des globules (en général : hémoglobine < 10g/dL, plaquettes < 100 000/mm³, polynucléaires neutrophiles < 1000/mm³). Dans ce cas, vous devrez faire une prise de sang chaque semaine, pour pouvoir reprendre la chimiothérapie quand la prise de sang sera normalisée.

Le médecin vous proposera la pose d'une chambre implantable (PAC). Il s'agit d'un petit boîtier placé sous la peau de votre thorax, qui donne accès directement à une veine profonde. Ce boîtier peut être posé sous anesthésie locale, dès le début de la chimiothérapie. Il s'agit d'une opération simple et rapide. Les perfusions se font ensuite dans le boîtier, et pas dans les veines du bras. Ceci permet d'éviter d'abîmer les veines du bras, d'autant plus que la chimiothérapie peut être toxique si elle diffuse sous la peau lors d'une perfusion dans la veine d'un bras.

L'évaluation des résultats de la chimiothérapie se fait en général **après 3 à 6 mois de traitement, par un scanner complet.**

Le traitement est en général poursuivi s'il est efficace sur la maladie et bien supporté par le patient.

Enfin, l'hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie.