

## FICHE D'INFORMATION PATIENT : Traitement par MUPHORAN

Vous avez une chimiothérapie par Muphoran® pour un mélanome. Le Muphoran® vous sera administré par **voie intraveineuse** en hospitalisation dans le service de Dermatologie.

Lors de chaque « cure » de Muphoran, vous aurez **une perfusion sur une hospitalisation d'une journée. La perfusion dure environ 1h.**

Selon les cas, le médecin peut vous prescrire initialement le **Muphoran à fortes doses (phase d'attaque), avec 3 « cures » réparties sur 15 jours** : une perfusion sur une journée, puis une perfusion une semaine plus tard, puis une perfusion une semaine plus tard. Ensuite, vous aurez une période de pause de 4 à 5 semaines. Ensuite, vous aurez le **traitement d'entretien** : une « cure » de Muphoran **tous les 21 jours**.

Selon les cas, le médecin peut vous prescrire d'emblée le Muphoran à la dose d'entretien : une « cure » de Muphoran **tous les 21 jours**.

Cette chimiothérapie est en règle générale **assez bien tolérée**. Les effets secondaires peuvent être :

- **nausées, vomissements** : après la perfusion et les jours suivants. Ces effets sont atténués par la prescription de médicaments adaptés.
- **une diminution des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes**
- rarement, des symptômes semblables à une grippe, avec fatigue, fièvre, douleurs diffuses, qui peuvent être traité par du paracétamol (Doliprane®, Efférgan®...)
- des anomalies du foie
- de la diarrhée
- il n'y a pas de perte de cheveux.

Vous pouvez rentrer chez vous à la fin de la cure. Vous aurez un traitement contre les nausées.

Selon votre tolérance, vous pourrez continuer de travailler entre les cures de chimiothérapie. Si vous êtes trop fatigué, le médecin vous prescrira un arrêt de travail.

Vous devrez faire **une prise de sang dans un laboratoire d'analyses, 3 jours avant la cure suivante**, afin de surveiller les globules rouges, globules blancs et les plaquettes et le bilan du foie. Les résultats devront être transmis par le laboratoire d'analyses par **fax** dans le service de Dermatologie. **Emmenez tout de même les résultats de votre prise de sang avec vous, lors la cure de chimiothérapie**. La cure pourra être annulée et décalée en cas de diminution importante des chiffres des globules (en général : hémoglobine < 10g/dL, plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup>, polynucléaires neutrophiles < 1000/mm<sup>3</sup>). Dans ce cas, vous devrez faire une prise de sang chaque semaine, pour pouvoir reprendre la chimiothérapie quand la prise de sang sera normalisée.

**Le médecin vous proposera la pose d'une chambre implantable (PAC)**. Il s'agit d'un petit boîtier placé sous la peau de votre thorax, qui donne accès directement à une veine profonde. Ce boîtier peut être posé sous anesthésie locale, dès le début de la chimiothérapie. Il s'agit d'une opération simple et rapide. Les perfusions se font ensuite dans le boîtier, et pas dans les veines du bras. Ceci permet d'éviter d'abîmer les veines du bras, d'autant plus que la chimiothérapie peut être toxique si elle diffuse sous la peau lors d'une perfusion dans la veine d'un bras.

L'évaluation des résultats de la chimiothérapie se fait en général **après 3 à 6 mois de traitement, par un scanner complet**.

Enfin, l'hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie.