

## FICHE D'INFORMATION PATIENT

### Traitement par Plaquenil

Votre médecin vous a prescrit un traitement par hydroxychloroquine (Plaquenil®) pour votre maladie de peau.

Il s'agit d'un traitement qui diminue l'inflammation et peut ainsi améliorer votre maladie de peau.

L'administration de Plaquenil se fait en deux prises par jour, matin et soir, avec un verre d'eau, après la fin des repas.

#### **Les effets secondaires principaux du Plaquenil peuvent être :**

- **une atteinte de la rétine de l'oeil (rétinopathie).** La rétinopathie ne survient en général que pour des doses importantes ou des traitements prolongés, et si vous avez déjà des problèmes visuels particuliers. La rétinopathie est en général réversible si elle est dépistée à temps, avec une surveillance ophtalmologique régulière ;
- **une intolérance digestive avec nausées et vomissements**, qui peut être diminuée en prenant les comprimés en fin de repas
- rarement, une diminution des globules rouges ou des globules blancs, et exceptionnellement, une toxicité sur le foie.

Vous devez donc :

- **consulter systématiquement un ophtalmologue (en lui précisant bien que vous avez un traitement par Plaquenil), dans les premières semaines qui suivent le début du traitement, puis au moins une fois par an.**
- en cas de troubles de la vision, arrêter le Plaquenil et consulter un ophtalmologue ;
- réaliser une analyse sanguine pour surveillance des globules rouges, des globules blancs et du foie, si votre médecin le juge nécessaire.

**La prise de Plaquenil peut interagir avec certains médicaments :** la ciclosporine, les hormones thyroïdiennes, les topiques gastrointestinaux anti-acides.

Enfin, l'hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie de peau.