

## FICHE D'INFORMATION PATIENT : RITUXIMAB (MABTHERA)

Votre dermatologue vous a prescrit un traitement par Rituxumab. Il s'agit d'un anticorps dirigé contre les lymphocytes, qui sont des cellules sanguines impliquées dans le système immunitaire. Le Rituximab est prescrit dans certaines maladies de peau et maladies générales.

Le Rituximab est administré en hospitalisation, par perfusion intraveineuse. Ceci nécessite **2 jours d'hospitalisation** : le premier jour, la perfusion de Rituximab est réalisée, lentement, pour surveiller l'apparition de signes de mauvaise tolérance. Le 2ème jour, il s'agit d'une simple surveillance.

Selon votre maladie, le dermatologue pourra prescrire **2, 3 ou 4 perfusions de Rituximab, espacées de 7 jours.**

Les effets indésirables peuvent être :

- **des réactions lors de la perfusion, principalement lors de la 1<sup>ère</sup> perfusion** : fièvre, frissons, tremblements, bouffées de chaleur, nausées, vomissements, difficultés respiratoires. **Les réactions sont habituellement réversibles après la diminution de la vitesse ou l'arrêt de la perfusion.** Dans la plupart des cas, la perfusion peut reprendre après disparition complète des symptômes.
- **des infections sont possibles**, le plus souvent bénignes : rhume, bronchite, sinusite, infections urinaires... Des infections graves peuvent être observées pendant le traitement.
- de très rares cas de **leucoencéphalite multifocale** (infection cérébrale liée à un virus)
- les agents immunomodulateurs peuvent augmenter le risque de tumeur. **Le risque potentiel de développer une tumeur ne peut être exclu actuellement, bien que les données disponibles ne semblent suggérer aucun risque accru.**

Il faut donc :

- **rechercher toute infection en cours** (tuberculose, hépatites, SIDA, infection dentaire...) avant de débiter le Rituximab,
- **mettre à jour les vaccinations** (tétanos, pneumocoque). Toutes les vaccinations devront être terminées au moins 4 semaines avant la première administration de Rituximab
- **avoir une prémédication par corticoïdes, antihistaminiques et paracétamol avant chaque perfusion de Rituximab**
- **avoir une contraception et ne pas avoir de grossesse sous Rituximab** et dans les 12 mois qui suivent les perfusions
- **consulter votre médecin en cas de signes d'infection** (fièvre, frissons, bronchite, toux, sinusite, ...)
- **consulter en cas de signes neurologiques ou psychiatriques.**