

FICHE D'INFORMATION PATIENT

Traitement par Acitrétine

Votre médecin vous a prescrit un traitement par Acitrétine (Soriatane®) pour votre maladie de peau.

Les gélules de Soriatane® se prennent une fois par jour, au cours d'un repas.

Les effets secondaires principaux du Soriatane peuvent être :

- **risque de malformations fœtales sévères en cas de survenue d'une grossesse au cours du traitement et au cours des 2 mois suivant son arrêt ;**
- sécheresse plus ou moins importante de la peau, des lèvres, de la bouche, des yeux
- chute de cheveux et fragilité des ongles
- sensibilité au soleil
- maux de tête, douleurs musculaires
- des anomalies de la fonction du foie
- une élévation des lipides sanguins
- un déséquilibre du diabète si vous êtes déjà diabétique

Vous devez :

- **pour les femmes :**

- **avoir une contraception efficace obligatoire sans interruption depuis au moins 1 mois avant le début du traitement, tout au long de celui-ci et pendant les 2 mois qui suivent l'arrêt du traitement** puis, par mesure de prudence, pendant les 2 ans qui suivent l'arrêt du traitement. **Cette contraception est obligatoire** chez toute femme susceptible de procréer.
- **présenter un test de grossesse négatif** datant de moins de 3 jours avant la mise en route du traitement. Un **test de grossesse doit être effectué tous les 2 mois** pendant le traitement et régulièrement à l'arrêt du traitement.
- **éviter la prise d'alcool pendant la durée du traitement par Soriatane** (augmente la durée d'exposition au Soriatane malgré l'arrêt du médicament et nécessite de prolonger la contraception)
- **appliquer des crèmes hydratantes pour le visage et le corps, un baume à lèvres, des larmes artificielles, éviter le port de lentilles de contact**
- avoir une surveillance régulière des marqueurs du foie et des lipides par une prise de sang, en général tous les 15 jours au cours des 2 premiers mois puis tous les 2 mois.
- **avoir une alimentation allégée en graisses** en raison du risque d'élévation des lipides sanguins, surtout en cas de facteurs de risque (surpoids, alcool, diabète...)
- **ne pas réaliser de don de sang**

Ne pas associer la prise de Soriatane et les antibiotiques de la famille des **cyclines**.

Enfin, l'hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie de peau.