

## FICHE D'INFORMATION PATIENT

### Traitement par Toctino

Votre médecin vous a prescrit un traitement par Toctino pour votre eczéma des mains.

La capsule doit être prise une fois par jour, au cours d'un repas.

#### Les effets secondaires principaux peuvent être :

- **risque de malformations fœtales sévères en cas de survenue d'une grossesse au cours du traitement et au cours du mois suivant son arrêt ;**
- sécheresse plus ou moins importante de la peau, des lèvres, de la bouche, des yeux
- sensibilité au soleil
- maux de tête, douleurs musculaires
- tristesse, dépression
- des anomalies de la fonction du foie
- une élévation des lipides sanguins

Vous devez :

- **appliquer des crèmes hydratantes pour le visage et le corps, un baume à lèvres, des larmes artificielles, éviter le port de lentilles de contact**
- avoir une surveillance régulière des marqueurs du foie et des lipides par une prise de sang, en général tous les 15 jours au cours des 2 premiers mois puis tous les 2 mois.
- **avoir une alimentation allégée en graisses** en raison du risque d'élévation des lipides sanguins, surtout en cas de facteurs de risque (surpoids, alcool, diabète...)

Ne pas associer la prise de Toctino avec les antibiotiques de la famille des **cyclines**.

Enfin, l'hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie de peau.